



이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【개발경위·개요 및 특징】

일반적으로 어린이를 어른의 축소판이라고 생각하기 쉬우나 어린이는 특히 위·장을 비롯한 신체의 여러기능이 아직도 약한 상태이므로 음식물이나 기타 외부조건 등에 의해 각종 소화기 이상을 자주 일으키게 됩니다.

백초디에스 시럽은 생약성분을 배합한 어린이 한방탕으로서 소화불량, 설사, 구토 등의 소화기 질환을 개선시켜줄 뿐만 아니라 소화·배설 및 수면상태로 나타나는 어린이의 신체기능을 근본적으로 강화시켜 삼쾌(三快: 快食, 快便, 快眠)를 유지시켜 줌으로써 어린이를 튼튼하게 자라도록 해줍니다.

【원료약품의 분량】 100mL중

감초엑스(약전)	1,000mg
아선약20% 에탄올 추출액(별규)	8.5mL
(1 → 2.5)	
황련·황백50% 에탄올 추출액(별규)	5.8mL
(1 → 2.5)	
인삼유동엑스(식품의약품청고시)	0.3mL
육계70% 에탄올틴크(별규)	3.5mL
(1 → 5)	
황금연조엑스(별규)	0.12g
(2.5 → 1)	
용담에탄올추출액(별규)	0.8mL
(1 → 0.8)	
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(약전)	50mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(약전)	50mg

【성상】 특이한 맛과 냄새를 지닌 담황갈색의 현탁시럽이 담긴 갈색유리병입니다.

【작용(약리)】

- 순수 생약성분을 합리적으로 배합하였습니다.
백초디에스는 甘·溫과 苦·寒의 생약을 배합한 어린이 한방탕으로서, 비·위를 補하고 심·소장을 안정시켜 줌으로써 각종 어린이 소화기 질환을 개선시켜 줍니다.
- 三快를 유지시켜 줍니다.
백초디에스는 소화, 정장·지사 및 진정·진경의 3대 작용에 의해 快食(쾌식), 快便(쾌변), 快眠(쾌면)을 유지시켜줌으로써 어린이를 튼튼하게 자라도록 해줍니다.
- 체질에 관계없이 복용하기 좋습니다.
백초디에스는 타 장기에 영향을 미치지 않고 위·장 기능을 강화시켜 주는 순수생약 시럽제로서 맛이 좋아 어린이에게 먹이기 좋습니다.

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 묽은변, 변비, 구역, 구토, 정장, 장내이상발효, 복부팽만감, 위부팽만감, 과식, 식체(위체)

【용법·용량】

소아용량 : 3개월이상~1세미만	1.0mL
1~2세	2.0mL
3~4세	2.5mL
5~7세	3.5mL
8~10세	5.0mL
11~14세	6.5mL

성인 1회 10mL, 1일 3회 식후 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
 - 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 혈압이 높은 환자 또는 고령자
 - 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자

- 부종이 있는 환자
- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압 오름거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
 - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.
- 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.
칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

2. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여하십시오.
- 2주 또는 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

3. 소아에 대한 투여

이 약은 3개월 미만의 영아에게는 투여하지 마십시오. 또 3개월 이상이라도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 투여하지 마십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 오용을 막고 품질을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 100, 500 mL

- ※ 사용기한이 경과되었거나 유통 과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성일자(2008년 12월 10일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-0033) 로 문의하시기 바랍니다.

어린이 백초디에스시럽은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 마개(CRC=Child-Resistant Closure)를 사용하여 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.



【사용법】

- 뚜껑을 누른 상태에서
- 시계 반대 방향으로 돌려주세요.